

1475

药物治
疗学-本

伯仲教育

一、单项选择题（每题 2 分，共 80 分）

1. 医生开具处方应当遵循的原则是（ ）。
 - A. 优先选用创新药物
 - B. 选用患者指定的药物
 - C. 选用安全、有效、经济的药物
 - D. 主要根据个人临床经验选用药物
2. 下列证据类型中，不属于原始研究的是（ ）。
 - A. 系统评价
 - B. 随机对照试验
 - C. 观察性研究
 - D. 数据库分析研究
3. 终点指标不包括（ ）。
 - A. 病死率、病残率
 - B. 疾病治愈率
 - C. 血糖水平
 - D. 心血管并发症发生率
4. 循证医学定义的核心内容不包括（ ）。
 - A. 规章制度
 - B. 临床医生个人经验
 - C. 患者意愿
 - D. 系统化评价和合成的研究证据
5. 成年男性贫血的诊断标准是（ ）。
 - A. 血红蛋白 $<110\text{g/L}$
 - B. 血红蛋白 $<120\text{g/L}$
 - C. 血细胞比容 <0.35
 - D. 红细胞计数 $<3.5 \times 10^{12}/\text{L}$
6. 反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是（ ）。
 - A. 空腹血糖
 - B. 餐后 2 小时血糖
 - C. 尿糖
 - D. 糖化血红蛋白
7. 下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法正确的是（ ）。
 - A. α 受体阻滞剂的代表药物有哌唑嗪、美托洛尔等
 - B. α 受体阻滞剂一般作为高血压治疗的首选药
 - C. β 受体阻滞剂禁用于直立性低血压患者
 - D. β 受体阻滞剂尤其适用于伴快速心律失常、冠心病、心力衰竭、交感神经活性增高以及高动力状态的高血压患者
8. 药学信息服务不包括（ ）。
 - A. 建立医院基本药物目录和协定处方集
 - B. 对药品的使用数据进行挖掘
 - C. 参与药品不良事件的报告和分析
 - D. 进行新药的研究和开发
9. 不属于心力衰竭治疗基本药物的是（ ）。
 - A. β 受体阻滞剂
 - B. 呋塞米
 - C. 维拉帕米
 - D. 依那普利
10. 不属于抗心律失常药物治疗的目的及原则的是（ ）。
 - A. 治疗目的是减轻房颤的相关症状
 - B. 抗心律失常药物治疗可减少但不能消除房颤复发
 - C. 如果一种抗心律失常药物治疗“无效”，可考虑换用其他抗心律失常药物
 - D. 选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性而不是安全性
11. 与伪麻黄碱合用可能造成“重复用药”的药物是（ ）。
 - A. 泰诺
 - B. 氯苯那敏
 - C. 布洛芬
 - D. 泰诺林
12. 长期治疗持续性哮喘的首选药物为（ ）。
 - A. 沙丁胺醇
 - B. 布地奈德
 - C. 异丙托溴铵
 - D. 孟鲁司特

- A.布地奈德雾化吸入溶液
B.布地奈德干粉吸入剂（都保）
C.硫酸特布他林气雾剂
D.沙丁胺醇气雾剂
- 13.脑血栓形成最常见的病因是（ ）。
A.脑动脉粥样硬化
B.脑动脉炎
C.结缔组织疾病
D.先天性血管畸形
- 14.药疹治疗的首要措施是（ ）。
A.应用大剂量糖皮质激素
B.输血促进药物排泄
C.停用致敏药物
D.应用激素并同时用抗菌药物
- 15.推荐在给药前进行 HLA-B* 1502 基因筛查的药品是（ ）。
A.丙戊酸钠
B.左乙拉西坦
C.加巴喷丁
D.卡马西平
- 16.左旋多巴治疗帕金森病的机制是（ ）。
A.左旋多巴在脑内转变为 DA，补充纹状体内 DA 的不足
B.提高纹状体中乙酰胆碱的含量
C.提高纹状体中 5-HT 含量
D.降低黑质中乙酰胆碱的含量
- 17.下列不属于阿尔海默病的危险因素的是（ ）。
A.脑梗死
B.心血管疾病
C.血液病
D.吸烟与饮酒
18. AD 患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状，可以选用的药物是（ ）。
A.氯硝西泮
B.奥氮平
C.氟西汀
D.唑吡坦
- 19.属于短效 BZDs 类的药物是（ ）。
A.咪达唑仑
B.地西泮
C.氟西汀
D.氯硝西泮
- 20.患者男，16 岁，诊断抑郁症，应用氟西汀 3 个月后，抑郁症状完全消失，下一步处理是（ ）。
A.换用更新型抗抑郁药度洛西汀继续治疗
B.立即停药
C.缓慢减量，1 周后停药
D.继续原方案治疗
- 21.第二代抗精神病药物的特点错误的是（ ）。
A.作用机制为单一阻断多巴胺受体，故称为典型抗精神病药物
B.对精神分裂症的阳性和阴性症状均有效
C.一般不影响患者的认知功能，不良反应相对较小
D.现已成为治疗精神分裂症的一线药物
- 22.关于消化性溃疡的发病机制的叙述较全面的是（ ）。
A.迷走神经张力增加，使胃酸分泌亢进，从而引起溃疡
B.致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
C.胃壁局限性缺血，胃壁被消化形成溃疡
D.胃液和胃蛋白酶分泌增加，促使胃组织蛋白发生水解，形成溃疡
- 23.不属于甲氧氯普胺禁忌证的是（ ）。
A.肠梗阻
B.胃穿孔
C.恶心、呕吐
D.帕金森综合征

24. 下列关于药物治疗作用的描述，错误的是（ ）。
- A. 磺脲类药物是通过作用于胰岛 β 细胞表面的受体促进胰岛素分泌
 - B. 葡萄糖苷酶抑制剂可降低餐前血糖
 - C. 噻唑烷二酮类药物可增强胰岛素在外周组织的敏感性，减轻胰岛素抵抗
 - D. 双胍类药物主要是通过促进外周组织摄取葡萄糖，加速无氧糖酵等途径改善糖代谢
25. 关于二甲双胍的说法不正确的是（ ）。
- A. 本品不可与磺脲类口服降糖药合用，合用时低血糖风险增加
 - B. 对于 1 型或 2 型糖尿病，本品与胰岛素合用，可增加胰岛素的降血糖作用，减少胰岛素用量
 - C. 许多国家制定的糖尿病指南中推荐二甲双胍作为 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药
 - D. 本品首选用于单纯饮食及体育运动不能有效控制的 2 型糖尿病
26. 可促进铁剂吸收的维生素是（ ）。
- A. 维生素 E
 - B. 维生素 B6
 - C. 维生素 B12
 - D. 维生素 C
27. 妊娠高血压进行降压治疗的药物不包括（ ）。
- A. 拉贝洛尔
 - B. 尼莫地平
 - C. 酚妥拉明
 - D. 硫酸镁
28. 下列药物使用期间应密切关注血糖的是（ ）。
- A. 环孢素
 - B. 他克莫司
 - C. 吗替麦考酚酯
 - D. 左旋咪唑
29. 不宜处方用于泌尿系统感染的抗菌药物是（ ）。
- A. 左氧氟沙星
 - B. 莫西沙星
 - C. 头孢曲松
 - D. 厄他培南
30. 第五生命体征是（ ）。
- A. 体温
 - B. 疼痛
 - C. 脉搏
 - D. 血压
31. 不属于阿片类药物的特点的是（ ）。
- A. 种类多、剂型也多
 - B. 具有封顶效应
 - C. 个体差异明显
 - D. 首选口服途径给药
32. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是（ ）。
- A. 按阶梯用药
 - B. 疼痛时给药
 - C. 个体化给药
 - D. 口服给药
33. 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物，应长期维持使用的是（ ）。
- A. 羟氯喹
 - B. 吗替麦考酚酯
 - C. 他克莫司
 - D. 雷公藤多苷
34. 下列关于 NSAID 的描述，错误的是（ ）。
- A. 有 2~3 种胃肠道危险因素存在时，应加用预防溃疡病的药物
 - B. 对腰椎间盘突出症而言，使用 NSAID 可以防止疾病的发展及合并症的发生
 - C. 通常选用一种 NSAID，在足量使用 2~3 周后无效，可更换另一种，待有效后再逐渐减量
 - D. 同时使用两种 NSAID，疗效不一定能增加疗效，而可能不良反应增加
35. 关于阿仑膦酸钠患者用药指导，不正确的是（ ）。
- A. 早餐前 30min 用

- B.服药前后 30min 内不宜饮用牛奶、奶制品、含钙较高的饮料、橘子汁和咖啡
 C.服药后可静卧 10 分钟
 D.患者在每周的固定一天服用本品
- 36.下列关于维生素 D3 治疗骨质疏松的说法中，不正确的是（ ）。
- A.维生素 D3 是促进肠道 Ca^{2+} 吸收的唯一激素
 B.维生素 D3 可促进钙、磷在肾脏的重吸收
 C.维生素 D3 可反馈性的抑制甲状旁腺素的释放
 D.长期服用维生素 D3，也不会导致患者维生素 D3 蓄积中毒
- 37.下列不是常用的减充血剂的是（ ）。
- A.伪麻黄碱
 B.1%伪麻黄碱溶液
 C.氯雷他定
 D.0.05%盐酸羧甲唑啉
- 38.眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用，下列说法正确的是（ ）。
- A.抗炎效力：泼尼松龙>地塞米松>氟米龙>氢化可的松
 B.抗炎效力：地塞米松>泼尼松龙>氟米龙>氢化可的松
 C.抗炎效力：地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松
 D.抗炎能力：泼尼松龙>氟米龙>地塞米松>氢化可的松
- 39.对于脱髓鞘性视神经炎患者在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗，治疗方案是（ ）。
- A.地塞米松 5mg/d 静脉滴注
 B.甲泼尼龙 1g/d 静脉滴注
 C.甲泼尼龙 2g/d 静脉滴注
 D.地塞米松 10mg/d 静脉滴注
- 40.银屑病临床上可分为（ ）。
- A.急性、亚急性和慢性
 B.寻常型、增殖型、落叶型、红斑型
 C.重型和轻型
 D.寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型
- 二、配伍选择题（配伍选择题是一组试题（2-4 题）共用四个备选项。备用选项在前，题干在后。备用选项可重复选用，也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题 2 分，共 20 分）
- [41-43]
- A.伪麻黄碱
 B.氨溴索
 C.马来酸氯苯那敏
 D.奥司他韦
- 41.普通感冒常用药物中，能选择性收缩上呼吸道血管，对血压的影响较小的药物是（ ）。
- 42.普通感冒常用药物中，有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状，但常见不良反应包括嗜睡、疲乏的药物是（ ）。
- 43.普通感冒常用药物中，常用的祛痰药是（ ）。
- [44-46]
- A.地西洋
 B.多塞平
 C.唑吡坦
 D.螺内酯
- 44.治疗失眠的药物中，属于长效苯二氮革类药物的是（ ）。
- 45.治疗失眠的药物中，属于非苯二氮革类药物的是（ ）。
46. FDA 批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是（ ）。
- [47-50]
- A.冷湿敷，如 3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吡啶溶液等
 B.外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等，可合用保湿剂及角质松解剂

- C.外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
- D.炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶

- 47.湿疹急性期无水肿、糜烂、渗液时，药物治疗选择（ ）。
- 48.湿疹急性期有大量渗出时，药物治疗选择（ ）。
- 49.湿疹亚急性期药物治疗选择（ ）。
- 50.湿疹慢性期药物治疗选择（ ）。

参考答案：一、单项选择题（每题 2 分，共 80 分）

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1.C | 2.A | 3.C | 4.A | 5.B |
| 6.D | 7.D | 8.D | 9.C | 10.D |
| 11.A | 12.B | 13.A | 14.C | 15.D |
| 16.A | 17.C | 18.B | 19.A | 20.D |
| 21.A | 22.B | 23.C | 24.A | 25.A |
| 26.D | 27.D | 28.B | 29.B | 30.B |
| 31.B | 32.B | 33.A | 34.B | 35.C |
| 36.D | 37.C | 38.C | 39.B | 40.D |

二、配伍选择题（每题 2 分，共 20 分）

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 41.A | 42.C | 43.B | 44.A | 45.C |
| 46.B | 47.D | 48.A | 49.C | 50.B |

(二)

一、单项选择题（每小题 2 分，共 80 分）

1. 下列说法不正确的是()。
- A. 以肝脏代谢为主的药物，在肝脏衰竭时 $T_{1/2}$ 明显延长
 - B. 以肾排泄为主的药物，在肾衰竭时 $T_{1/2}$ 明显缩短
 - C. 心衰可导致全身脏器淤血，使药物的 $T_{1/2}$ 明显延长
 - D. 干扰胃肠道功能的疾病可改变口服药物的吸收过程
2. RCT 的含义是()。
- A. 专家的会诊意见
 - B. 队列研究
 - C. 随机对照试验
 - D. 病例对照研究
3. 按照GRADE 证据质量分级标准，证据质量共被分为()级。
- A. 5
 - B. 4
 - C. 3
 - D. 6
4. 药学信息服务不包括()。
- A. 建立医院基本药物目录和协定处方集
 - B. 对药品的使用数据进行挖掘
 - C. 参与药品不良事件的报告和分析
 - D. 进行新药的研究和开发
5. 成人正常血小板计数参考范围为()。
- A. $(100\sim300)\times 10^9/L$
 - B. $(100\sim300)\times 10^{12}/L$
 - C. $(4\sim10)\times 10^{12}/L$
 - D. $(4\sim10)\times 10^9/L$
6. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是()。

- A. 缬沙坦
C. 硝苯地平
- B. 呋塞米
D. 维拉帕米
7. 不属于心力衰竭治疗基本药物的是()。
- A. 日受体阻滞剂
C. 维拉帕米
- B. 呋塞米
D. 依那普利
8. 关于他汀类说法错误的是()。
- A. 孕妇、胆汁淤滞及活动性肝病者禁用
B. 最严重的不良反应是粒细胞减少及肾功能受损
C. 临床常用的有：阿托伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀
D. 主要用于杂合子家族性和非家族性 II a, II b 和 III 型高脂血症
9. 关于华法林的说法, 不正确的是()。
- A. 需要定期检测 INR
C. 剂量不足容易引起栓塞
- B. 过量容易引起出血
D. 食物对华法林的作用影响小
10. 患者, 男, 72 岁, 主因“血压升高 6 个月”入院。患者不规律服用中成药, 血压控制不佳。3 个月前患者将降压药物调整为氨氯地平, 血压波动于 160~170/90~100mmHg。该患者目前血压控制不佳, 需联合降压药物, 不适合的是()。
- A. 缬沙坦
C. 赖诺普利
- B. 硝苯地平
D. 美托洛尔
11. 对乙酰氨基酚(扑热息痛)属于()。
- A. 解热镇痛药
C. 止咳剂
- B. 鼻黏膜血管收缩剂
D. 过敏剂
12. 避免吸入激素后的口咽部不良反应的方式中, 不正确的表述是()。
- A. 吸药后及时用清水漱口咽部
C. 加用储雾罐
- B. 选用干粉吸入剂
D. 选用普通定量气雾剂
13. 肺结核初治的疗程为()。
- A. 强化期 2 个月 / 巩固期 4 个月
c. 强化期 3 个月 / 巩固期 8 个月
- B. 强化期 3 个月 / 巩固期 5 个月
D. 强化期 4 个月 / 巩固期 2 个月
14. 他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括()。
- A. 预防脑血管痉挛
C. 预防脑梗死再发
- B. 抗动脉粥样硬化
D. 降血脂
15. 重型药疹应及早应用()。
- A. 免疫抑制剂
C. 免疫调节剂
- B. 维甲酸类药物
D. 糖皮质激素
16. 下列药物单用治疗帕金森病无效的是()。
- A. 左旋多巴
C. 司来吉兰
- B. 卡比多巴
D. 普拉克莫
17. 阿尔茨海默症患者的首发症状是()。
- A. 记忆障碍
C. 理解力和判断力障碍
- B. 时间、空间定向障碍
D. 睡眠障碍
18. 不属于治疗轻中度 AD 的一线药物的是()。
- A. 卡巴拉汀
C. 加兰他敏
- B. 美金刚联合多奈哌齐
D. 多奈哌齐
19. 下列不是失眠首选药物的是()。
- A. 唑吡坦
B. 劳拉西泮

- C. 艾司唑仑
D. 氯硝西洋
20. 以下抗抑郁药物治疗原则不恰当的是()。
- A. 剂量逐步递增, 尽可能采用最小有效剂量
B. 小剂量疗效不佳时, 增至足量、足疗程
C. 如仍无效, 可考虑换药, 但不能换用同类另一种药
D. 尽可能单一用药
21. 下列精神分裂症药物治疗原则错误的是()。
- A. 确定诊断后, 应首先采用心理治疗等非药物干预
B. 复发患者应换用之前未使用过的药物
C. 药物不良反应可加重精神症状, 应重视
D. 应尽可能单一用药
22. 下列根除幽门螺杆菌的三联疗法不合理的是()。
- A. 胶体次枸橼酸铋十四环素十甲硝唑
B. 奥美拉唑十阿莫西林十甲硝唑
C. 奥美拉唑十克拉霉素十甲硝唑
D. 硫糖铝十阿莫西林十替硝唑
23. 关于药物蒙脱石的描述, 错误的是()。
- A. 具有吸附、收敛的作用
B. 可能影响其他药物的吸收, 合用时应间隔 2h 左右
C. 不被胃肠道吸收, 不进人体液循环
D. 不适用于儿童腹泻
24. 不属于非促胰岛素分泌剂的是()。
- A. 双胍类
B. 噻唑烷二酮类
C. 格列奈类
D. α -糖苷酶抑制剂
25. 以下关于抗甲状腺药物的说法不正确的是()。
- A. 甲巯咪唑与丙硫氧嘧啶的作用机制基本相同
B. 因治疗需要, 抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗, 不能停药
C. 甲巯咪唑导致的粒细胞减少和粒细胞缺乏多发生在用药后的 2~3 个月内, 也可见于任何时期
D. 甲巯咪唑抗甲状腺作用较丙硫氧嘧啶约强 10 倍, 且疗效快, 持续作用时间长
26. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()。
- A. 口服吸收缓慢
B. 肝内代谢转化快
C. 肾脏排泄速度快
D. 待已合成的甲状腺激素耗竭后才能生效
27. 属于抗纤维蛋白溶解药的是()。
- A. 酚磺乙胺
B. 氨甲环酸
C. 凝血酶
D. 卡巴克洛
28. 使用时需注意高血钾的药物是()。
- A. 呋塞米
B. 氢氯噻嗪
C. 布美他尼
D. 螺内酯
29. 尿路感染最常见的细菌为()。
- A. 黏质沙雷菌
B. 大肠埃希菌
C. 肠球菌
D. 变形杆菌
30. 对疼痛的定义正确的表述是()。
- A. 是机体面临刺激或疾病的信号

- B. 是机体对创伤或疾病的反应机制，也是疾病的症状
 C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验
 D. 由外界创伤引起的机体损伤
31. 属于阿片受体拮抗剂的药品是()。
 A. 吗啡
 B. 可待因
 C. 纳洛酮
 D. 曲马多
32. 三阶梯止痛治疗方案的代表药物()。
 A. 阿司匹林、可待因、吗啡
 B. 阿司匹林、氨芬待因、吗啡
 C. 曲马多、可待因、吗啡
 D. 乙酰氨基酚、氨芬待因、吗啡
33. 治疗类风湿关节炎的药物中，每周给药一次的是()。
 A. 环磷酰胺
 B. 硫唑嘌呤
 C. 氨甲蝶呤
 D. 环孢素
34. 一位患者的 HLA-B* 5801 基因检测结果为阳性，如果他需要进行降尿酸的药物治疗，应避免使用()。
 A. 非布司他
 B. 别嘌醇
 C. 丙磺舒
 D. 苯溴马隆
35. 男性患者，72 岁，因左膝关节行走远距离后疼痛 5 年就诊，正侧位 X 线显示左膝内侧间隙变窄，边缘骨质增生，软骨下骨硬化，患者首选的药物治疗是()。
 A. 短期口服非甾体抗炎药
 B. 口服氨基葡萄糖类药物
 C. 关节腔内注射透明质酸钠
 D. 关节腔内注射激素
36. 滴虫性阴道炎的治疗药物首选()。
 A. 咪康唑
 B. 甲硝唑
 C. 庆大霉素
 D. 聚甲酚磺醛
37. 老年人缺乏维生素 D_a 的主要影响因素是()。
 A. 营养不良
 B. 消化功能减弱
 C. 免疫功能下降
 D. 户外活动减少
38. 急性鼻炎的最常见病原体种类为()。
 A. 柯萨奇病毒
 B. 鼻病毒
 C. 细菌
 D. 真菌
39. 结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性，以下药物治疗方法中不建议采用的是()。
 A. 局部给药为主，严重结膜炎必要时全身给药
 B. 根据微生物种类进行药物选择
 C. 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
 D. 眼膏宜睡前使用发挥持续治疗作用
40. 下列不是青光眼降眼压的常用药物的是()。
 A. 毛果芸香碱
 B. 曲伏前列素
 C. 氟米龙
 D. 噻吗洛尔

二、配伍选择题（配伍选择题是一组试题（2-4 题）共用四个备选项。备用选项在前，题干在后。备用选项可重复选用，也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题 2 分，共 20 分）

[41-43]

- A. 降压治疗
 - B. 镇静
 - C. 防治子痫
 - D. 防治呕吐
41. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 硝苯地平用于()。
42. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 硫酸镁用于()。
43. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 地西洋用于()。

[44-47]

- A. 密切监测血药浓度, 肾功能和血糖
 - B. 密切监测血药浓度及肝肾功能
 - C. 密切监测血常规、肝功能
 - D. 监护电解质水平
44. 肾病综合征患者服用利尿剂时应()。
45. 肾病综合征患者长期应用环孢素期间应()。
46. 肾病综合征患者应用吗替麦考酚酯期间应()。
47. 肾病综合征患者应用他克莫司期间需()。

[48-50]

- A. 维生素 K
 - B. 雌激素和孕激素
 - C. 维生素 D₃
 - D. 非甾体抗炎药
48. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 抑制骨吸收的药物是()。
49. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 促进骨形成的药物是()。
50. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 作用于骨矿化的药

参考答案: 一、单项选择题 (每题 2 分, 共 80 分)

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1.B | 2.C | 3.B | 4.D | 5.A |
| 6.C | 7.C | 8.B | 9.D | 10.B |
| 11.A | 12.D | 13.A | 14.A | 10.D |
| 16.B | 17.A | 18.B | 19.D | 20.C |
| 21.B | 22.D | 23.D | 24.C | 25.B |
| 26.D | 27.A | 28.D | 29.B | 30.C |
| 31.C | 32.A | 33.C | 34.B | 35.A |
| 36.B | 37.D | 38.B | 39.C | 40.C |

二、配伍选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 41.A | 42.C | 43.B | 44.D | 45.B |
| 46.C | 47.A | 48.B | 49.A | 50.C |

(三)

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 80 分)

1. 影响药物治疗的主要因素, 不包括()。
- A. 年龄
 - B. 性别

- C.肝肾功能
D.天气
- 2.按照 GRADE 证据质量分级标准, 证据质量共被分为()级。
A.5
B.4
C.3
D.6
- 3.不属于临床研究的是()。
A.专家会诊
B.随机对照试验
C.队列研究
D.病例对照研究
- 4.药学信息服务不包括()。
A.建立医院基本药物目录和协定处方集
B.提供新药信息
C.参与药品不良事件的报告和分析
D.处方审查
- 5.不属于冠心病的风险因素的是()。
A.甘油三酯水平增高
B.胆固醇水平增高
C.HDL-C 水平增高
D.LDL-C 水平增高
- 6.蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过()。
A.10mg/24h
B.100mg/24h
C.150mg/24h
D.1000mg/24h
- 7.利尿剂的主要不良反应是()。
A.大剂量使用会导致低血钾症和影响血脂、血糖和尿酸代谢
B.心动过缓、乏力、四肢发冷, 并对心肌收缩力、房室传导以及窦性心律有抑制作用
C.在开始治疗阶段反射性交感神经活性增强, 尤其在使用短效制剂时, 引起心率加快、面部潮红、头痛、下肢水肿等
D.刺激性干咳, 发生率为 10%-20%, 可能与体内缓激肽增多有关, 停药后消失
- 8.关于贝特类药物说法错误的是()。
A.常用药物有吉非贝齐, 非诺贝特, 苯扎贝特等
B.患肝、胆疾病、孕妇、儿童及肾功能不良者禁用
C.主要适应证为高甘油三酯血症或以 TG 升高为主的混合型高脂血症
D.对 TG 无降低作用甚至稍有升高
- 9.对于口服华法林的非瓣膜性房颤患者, 应调整药物剂量使 INR 保持在()。
A.0.8-1.5
B.1.5-2.5
C.2.0-3.0
D.3.0-4.0
- 10.血管紧张素转换酶抑制药的禁忌证不包括()。
A.高钾血症患者
B.蛋白尿患者
C.双侧肾动脉狭窄患者
D.妊娠期妇女
- 11.治疗哮喘给药途径以吸入疗法为优, 表述不正确的是()。
A.呼吸道内局部药物浓度高
B.用药量少
C.极少有全身不良反应
D.血药浓度高
- 12.控制慢性阻塞性肺疾病症状的主要治疗措施是使用()。
A.支气管扩张剂
B.磷酸二酯酶抑制剂
C.祛痰药
D.抗氧化剂
- 13.下列不是双重抗血小板治疗首选指征的是()。
A.轻型缺血性脑卒中患者(NIHSS 评分 \leq 3)
B.脑卒中发病 30d 内伴有症状性颅内动脉严重狭窄(狭窄率 70%-99%)

- C.急性非心源性 TIA(ABCD2 评分>4 分)
D.心源性栓塞导致的脑卒中
- 14.癫痫持续状态的首选药物治疗为()。
A.静注丙泊酚
B.肌注苯妥英钠
C.静注地西洋
D.肌注苯巴比妥
- 15.关于左旋多巴不良反应的说法,错误的是()。
A.胃肠道反应
B.心动过速
C.“开关”现象
D.肝性脑病
- 16.抗帕金森病的药物是()。
A.多巴胺受体阻断药
B.三环类药
C.胆碱受体激动药
D.胆碱受体阻断药
- 17.治疗头癣的口服药首选()。
A.灰黄霉素
B.制霉菌素
C.二性霉素
D.克霉唑
- 18.下列关于失眠治疗的说法,错误的是()。
A.入睡困难一般可使用短效抗失眠药物
B.睡眠维持障碍可用中、长效抗失眠药物
C.对于急性失眠,不应使用药物治疗,以免形成药物依赖
D.超过 4 周的药物干预需要每个月定期评估
- 19.与抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括()。
A.5-羟色胺
B.γ-氨基丁酸
C.去甲肾上腺素
D.多巴胺
- 20.精神分裂症最主要、最本质的症状是()。
A.感知觉障碍
B.思维障碍
C.情感障碍
D.意志和行为障碍
- 21.精神分裂症药物治疗原则,错误的是()。
A.确定诊断后,应首先采用心理治疗等非药物干预
B.复发患者应换用之前未使用过的药物
C.药物不良反应可加重精神症状,应重视
D.应尽可能单一用药
- 22.根除幽门螺杆菌的三联疗法,不合理的是()。
A.胶体次枸橼酸铋+四环素+甲硝唑
B.奥美拉唑+阿莫西林+甲硝唑
C.奥美拉唑+克拉霉素+甲硝唑
D.硫糖铝+阿莫西林+替硝唑
- 23.以下关于药物蒙脱石的描述,错误的是()。
A.具有吸附、收敛的作用
B.可能影响其他药物的吸收,合用时应间隔 2h 左右
C.不被胃肠道吸收,不进人体液循环
D.不适用于儿童腹泻
- 24.非促胰岛素分泌剂不包括()。
A.双胍类
B.噻唑烷二酮类
C.格列奈类
D.α-糖苷酶抑制剂
- 25.以下关于抗甲状腺药物的说法,不正确的是()。

- A. 甲巯咪唑与丙硫氧嘧啶的作用机制基本相同
B. 因治疗需要，抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗，不能停药
C. 甲巯咪唑导致的粒细胞减少和粒细胞缺乏多发生在用药后的 2~3 个月内，也可见于任何时期
D. 甲巯咪唑抗甲状腺作用较丙硫氧嘧啶约强 10 倍，且疗效快，持续作用时间长
26. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是()。
- A. 口服吸收缓慢
B. 肝内代谢转化快
C. 肾脏排泄速度快
D. 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
27. 属于抗纤维蛋白溶解药的是()。
- A. 酚磺乙胺
B. 氨苯环酸
C. 凝血酶
D. 卡巴克洛
28. 下列药物在治疗肾病综合征时需注意高血钾的是()。
- A. 呋塞米
B. 氢氯噻嗪
C. 布美他尼
D. 螺内酯
29. 尿路感染最常见的细菌为()。
- A. 黏质沙雷菌
B. 大肠埃希菌
C. 肠球菌
D. 变形杆菌
30. 对疼痛的定义正确的表述是()。
- A. 是机体面临刺激或疾病的信号
B. 是机体对创伤或疾病的反应机制，也是疾病的症状
C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验
D. 由外界创伤引起的机体损伤
31. 癌症患者轻度疼痛，可选用()。
- A. 非甾体抗炎药
B. 弱阿片药
C. 强阿片药
D. 抗抑郁类药
32. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是()。
- A. 按阶梯用药
B. 疼痛时给药
C. 个体化给药
D. 口服给药
33. 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物，可控制皮疹和减轻光过敏的是()。
- A. 羟氯喹
B. 吗替麦考酚酯
C. 他克莫司
D. 雷公藤多苷
34. 下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎，使用注意中不正确的是()。
- A. 注意非甾体抗炎药的种类、剂量和剂型个体化
B. 定期监测血常规和肝肾功能
C. 通常选用一种非甾体抗炎药，如无效可换用另一种
D. 可同时服用两种或两种以上非甾体抗炎药
35. 雌激素预防和治疗骨质疏松的主要作用机制是()。
- A. 抑制体内生成新的破骨细胞，从而导致体内具有生物活性的破骨细胞数量减少，骨吸收活动减弱
B. 雌激素与骨细胞上雌激素受体结合，抑制破骨细胞的骨吸收作用，使骨基质形成增加
C. 直接增加特异性酪氨酸激酶的活性或间接抑制成骨细胞磷酸化酪氨酸蛋白磷酸酶的活性，最终增加磷酸化促进骨细胞增生

- D.破骨细胞通过自身的胞饮作用使雌激素进入细胞内，使破骨细胞的活性受到抑制
- 36.关于骨质疏松，下述说法中不正确的是()。
- A.VD₃与钙剂联合用药有相辅相成的效果
 B.肠道Ca²⁺吸收不良是骨质疏松症发病的重要原因
 C.VD₃的绝对适应证是长期接受糖皮质激素治疗的患者
 D.VD₃是维生素类药物，故可安全放心地服用
- 37.常用的减充血剂不包括()。
- A.伪麻黄碱
 B.1%伪麻黄碱溶液
 C.氯雷他定
 D.0.05%盐酸羧甲唑啉
- 38.眼用糖皮质激素抗炎效力正确的是()，
- A.泼尼松龙>地塞米松>氟米龙>氢化可的松
 B.地塞米松>泼尼松龙>氟米龙>氢化可的松
 C.地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松
 D.泼尼松龙>氟米龙>地塞米松>氢化可的松
- 39.通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是()。
- A.缬沙坦
 B.呋塞米
 C.硝苯地平
 D.维拉帕米
- 40.银屑病临床上可分为()。
- A.急性、亚急性和慢性
 B.寻常型、增殖型、落叶型、红斑型
 C.重型和轻型
 D.寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型

二、配伍选择题（配伍选择题是一组试题（2-4题）共用四个备选项。备用选项在前，题干在后。备用选项可重复选用，也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每小题2分，共20分）

【41-44】

- A.在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究
 B.队列研究、病例对照研究和横断面研究
 C.将系统评价中的多个不同结果的同类研究，合并为一个量化指标的统计学方法，从统计学角度达到增大样本量、提高检验效能的目的
 D.与药物作用直接相关的指标，表现为症状或检测指标的改善，通常在较短时间内出现变化
- 41.随机对照试验是指()。
- 42.荟萃分析是指()。
- 43.替代指标是指()。
- 44.属于观察性研究范畴的是()。

【45-47】

- A.地西洋
 B.多塞平
 C.唑吡坦
 D.螺内酯
- 45.治疗失眠的药物中，属于长效苯二氮革类药物的是()。
- 46.治疗失眠的药物中，属于非苯二氮革类药物的是()。
- 47.FDA批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是()。

【48-50】

- A.以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者

B.2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药

C.降低具有心血管高危风险的 2 型糖尿病患者主要心血管不良事件和肾脏事件复合终点发生发展的风险

D.在葡萄糖或其他刺激下胰岛 B 细胞分泌的一种激素

48.二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为()。

49.a⁻糖苷酶抑制剂适用于()。

50.钠葡萄糖共转运体 2 抑制剂可()。

参考答案： 一、单项选择题(每题2分,共80分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. B | 3. A | 4. D | 5. C |
| 6. C | 7. A | 8. D | 9. C | 10. B |
| 11. D | 12. A | 13. D | 14. C | 15. D |
| 16. D | 17. A | 18. C | 19. D | 20. B |
| 21. B | 22. D | 23. D | 24. C | 25. B |
| 26. D | 27. A | 28. D | 29. B | 30. C |
| 31. A | 32. B | 33. A | 34. D | 35. B |
| 36. D | 37. C | 38. C | 39. C | 40. D |

二、配伍选择题(配伍选择题是一组试题(2-4题)共用四个备选项。备用选项在前,题干在后。备用选项可重复选用,也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题2分,共20分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41. A | 42. C | 43. D | 44. B | 45. A |
| 46. C | 47. B | 48. B | 49. A | 50. C |